

4-3 雙曲線

重點一 雙曲線的定義

例題 1

下列方程式的圖形，何者為雙曲線？（8分）

(A) $|\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}-\sqrt{x^2+(y+1)^2}|=3$

(B) $|\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}-\sqrt{x^2+(y+1)^2}|=\sqrt{5}$

(C) $|\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}-\sqrt{x^2+(y+1)^2}|=2$

(D) $|\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}+\sqrt{x^2+(y+1)^2}|=6$

解：令 $P(x, y)$, $F_1(1, 1)$, $F_2(0, -1)$, $\overline{F_1F_2}=\sqrt{5}$

(A) \times : $|\overline{PF_1}-\overline{PF_2}|=3=2a$, $\overline{F_1F_2}<2a$, 沒有圖形

(B) \times : $|\overline{PF_1}-\overline{PF_2}|=\sqrt{5}=2a$, $\overline{F_1F_2}=2a$, 兩射線

(C) \circ : $|\overline{PF_1}-\overline{PF_2}|=2=2a$, $\overline{F_1F_2}>2a$, 雙曲線

(D) \times : $|\overline{PF_1}+\overline{PF_2}|=6=2a$, $\overline{F_1F_2}<2a$, 橢圓

故選(C)

重點二 雙曲線的標準式

例題 2

已知一雙曲線的兩焦點為 $(5, 0)$, $(-5, 0)$, 實軸長為 8, 試求此雙曲線的方程式。(7分)

解：因為焦點為 $(5, 0)$, $(-5, 0)$
所以中心為原點，實軸在 x 軸上

且方程式形如 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$

又 $c=5$, 實軸長 $2a=8 \Rightarrow a=4$

而 $b^2=c^2-a^2=5^2-4^2=9$

得雙曲線方程式為 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$

例題 3

試求雙曲線 $3x^2-4y^2=12$ 上任一點至兩條漸近線之距離乘積。(8分)

解： $3x^2-4y^2=12 \Rightarrow \frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1 \Rightarrow a^2=4, b^2=3$

所求為 $\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}=\frac{4 \times 3}{4+3}=\frac{12}{7}$

例題 4

一雙曲線之兩漸近線為 $2x + y - 1 = 0$ 與 $2x - y - 3 = 0$ ，且過 $(1, 1)$ ，則此雙曲線的方程式為_____。(7分)

解： 設雙曲線方程式為 $(2x + y - 1)(2x - y - 3) = k$
 過 $(1, 1) \Rightarrow (2 \times 1 + 1 - 1)(2 \times 1 - 1 - 3) = k \quad \therefore k = -4$
 得 $(2x + y - 1)(2x - y - 3) = -4$
 $\Rightarrow 4x^2 - y^2 - 8x - 2y + 3 = -4 \Rightarrow \frac{(y+1)^2}{4} - \frac{(x-1)^2}{1} = 1$

例題 5

已知雙曲線 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ ，試求：

- (1) 其兩條漸近線方程式。(8分) (2) 共軛雙曲線。(8分)

解： (1) 因為 $a=5, b=4$


所以長方形中的兩對角線斜率分別為 $\frac{4}{5}$ 與 $-\frac{4}{5}$

且過中心原點 O

因此兩漸近線方程式為 $y = \frac{4}{5}x$ 與 $y = -\frac{4}{5}x$

- (2) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的共軛雙曲線為 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = -1$ ，


即 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{25} = 1$



例題 6

一雙曲線的方程式為 $\Gamma: 9x^2 - 4y^2 - 18x + 16y - 43 = 0$ ，試求其兩條漸近線方程式。(8分)

解： $9x^2 - 4y^2 - 18x + 16y - 43 = 0$
 $\Rightarrow 9(x^2 - 2x + 1) - 4(y^2 - 4y + 4) = 36$
 $\Rightarrow \frac{(x-1)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{9} = 1$
 漸近線方程式為 $\frac{(x-1)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{9} = 0$
 $\Rightarrow \frac{x-1}{2} + \frac{y-2}{3} = 0$ 與 $\frac{x-1}{2} - \frac{y-2}{3} = 0$
 $\Rightarrow 3x + 2y - 7 = 0$ 與 $3x - 2y + 1 = 0$



例題 7

已知雙曲線 Γ 與 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ 有共同焦點，且其實軸長為 6，試求雙曲線 Γ 的方程式。(10 分)

解： 已知 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ 的中心為 $(0, 0)$ ，實軸在 y 軸上

$$\text{且 } a^2 = 16, b^2 = 9 \quad \therefore c^2 = 16 + 9 = 25$$

其共焦點的雙曲線亦為上下型 ，且實軸長 $2a' = 6 \Rightarrow a' = 3$

可假設雙曲線 $\Gamma: \frac{y^2}{3^2} - \frac{x^2}{b'^2} = 1$ ，利用 $3^2 + b'^2 = 25 \Rightarrow b'^2 = 16$

$$\text{故雙曲線 } \Gamma: \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$$

例題 8

試求經過點 $M(5, 8)$ 且與雙曲線 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ 有共同漸近線的雙曲線方程式。

(10 分)


解： 與 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ 有共同漸近線的雙曲線

$$\text{可假設雙曲線為 } \Gamma: \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = k$$

$$\text{已知 } M(5, 8) \in \Gamma$$

$$\frac{5^2}{25} - \frac{8^2}{16} = k \Rightarrow k = -3$$

$$\text{故雙曲線方程式 } \Gamma: \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = -3 \Rightarrow \frac{y^2}{48} - \frac{x^2}{75} = 1$$



重點三 雙曲線的平移與伸縮

例題 9

若將雙曲線 $\Gamma: \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ 以原點為中心伸縮 2 倍，得到一個新雙曲線 Γ' 的圖形，

試求：

- (1) 雙曲線 Γ' 的方程式。(6 分)
- (2) Γ' 的漸近線方程式。(6 分)

解： (1) 將雙曲線 $\Gamma: \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ 以原點為中心伸縮 2 倍


$$\text{可得雙曲線 } \Gamma': \frac{x^2}{(5 \times 2)^2} - \frac{y^2}{(4 \times 2)^2} = 1$$

$$\text{故雙曲線 } \Gamma': \frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1$$

(2) 設雙曲線 Γ' 的漸近線方程式為 $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 0$

$$\text{則兩條漸近線為 } 4x + 5y = 0 \text{ 與 } 4x - 5y = 0$$

(與原雙曲線 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的漸近線相同)



例題 10

某一雙曲線以 $2x + y = 0$, $2x - y + 4 = 0$ 為漸近線，且以 $(-1, 2 - \sqrt{5})$ 為一焦點。

試求：

- (1) 貫軸所在的直線方程式。(7 分)
- (2) 雙曲線方程式。(7 分)

解： (1) 已知 $\begin{cases} 2x + y = 0 \\ 2x - y + 4 = 0 \end{cases}$ 為其漸近線，其交點即為中心

聯立解得中心為 $(-1, 2)$

中心 $(-1, 2)$ 與焦點 $(-1, 2 - \sqrt{5})$ 皆在貫軸上

此雙曲線為直立型 ，故貫軸為 $x + 1 = 0$

(2) 雙曲線 Γ 可設為 $(2x + y)(2x - y + 4) = k$

$$\Leftrightarrow 4(x + 1)^2 - (y - 2)^2 = k$$

$$\therefore \Gamma: \frac{(y - 2)^2}{|k|} - \frac{(x + 1)^2}{4} = 1$$

$$\text{又 } \overline{OF} = \sqrt{5}, \text{ 利用 } a^2 + b^2 = c^2 \Leftrightarrow |k| + \frac{|k|}{4} = 5 \quad \therefore |k| = 4$$

$$\text{雙曲線方程式為 } \frac{(y - 2)^2}{4} - \frac{(x + 1)^2}{1} = 1$$

